

## 일반의약품

# 아크노 크림 Acnon

● 뾰루지·붉은여드름에

## 5. 저장성의 주의사항

- 소이의 소이 달지 않는 곳에 보관합니다.
- 직사광을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 마개를 닫아 보관합니다.
- 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.
- 사용기한을 넘긴 제품은 사용하지 않습니다.

[제공방법] 기밀용기, 차광실은(1~30°C) 보관

[포장단위] 13그램/튜브

[사용기한] 외부포장참조

## 제품명 애크노크림

[유효성분] 이 약 [9종]  
이부프로펜피코놀(IP) ..... 30mg  
이소프로필메틸페놀(별규) ..... 10mg

[첨가제(보존제)] 파라옥시벤조산베틸(KP) 1.6mg, 파라옥시벤조산프로필(KP) 0.4mg

[기타 첨가제] 글리세린모노스테아리레이트, 디메티콘, 미리스트레이소프로필, 백색설탕, 세린, 부틸렌글리콜, 부틸하이드록시톨루엔, 세토스테아릴알코올, 에데트산나트륨수화물, 정제수, 폴리옥실40스테아리레이트

[성상] 흰색 내지 연한 노란색의 크림제

[효능·효과] 여드름, 뾰루지

[용법·용량] 비누 등으로 세안 후 적당량을 1일 수회 환부(절환부위)에 도포한다.

## 4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - 의를 또는 흙검증등에 의해 일례르기 증상의 병력이 있는 환자
  - 습윤(습기 함)이나 진무름이 심한 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 상담시 기능한하여 청부문서를 소지할 것.
  - 국소적인 피부자극감(예: 발진(충혈되어 붉어짐), 가려움, 건조, 각열감(혈관근간), 자극감( 따끔따끔), 부기)
  - 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

## 5. 저장성의 주의사항

- 여드름, 뾰루지가 있는 부분에만 사용하고 주변의 넓은 부분이나 눈주위, 깊은 상처와 심한 회상에는 사용하지 않는다.
- 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻어준다.
- 이 약은 외용으로만 사용하고, 이의 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 적용부위 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.
- 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 의사와 상의한다.
- 광범위 병소(이픈 부위)에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용한다.

## 5. 저장성의 주의사항

- 소이의 소이 달지 않는 곳에 보관합니다.
- 직사광을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 마개를 닫아 보관합니다.
- 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.
- 사용기한을 넘긴 제품은 사용하지 않습니다.

## [최신정보확인방법]

\* 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.  
\* 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.  
\* 구입 시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원),  
14-3330(피해구제 신청전용번호)

v.210420

ACN13-21C003

작성일자 : 2021.04.20

제조의뢰자

자얼파마(주)

경기도 안양시 만안구 산단대로 35

제조자

(주)재뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245



한국제약원회 | 한약소비자원