

속편한~

소화불량 | 속쓰림 | 트림 | 위부불쾌감

일반의약품

베나치오세립

[유효성분] 이 약 1포(1,500 mg) 중

장출(KP)	850 mg	탄산수소나트륨(KP)	225 mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(KP)	70 mg	탄산칼슘(USP)	150 mg
(전분호화력 : 2,100 단위, 전분당화력 : 1,050 단위, 단백소화력 : 1,190 단위, 섬유소당화력 : 8.4 단위)		메타규산알루미늄산마그네슘(KP)	300 mg
리파제(지방소화력 : 420 단위)(KP)	70 mg	스코폴리아엑스(KP)	10 mg
프로자임(단백소화력 : 2,500 단위)(KP)	10 mg	디메티콘(NF)	12 mg

[첨가제] D-만니톨, 레몬향 코톤, 미결정셀룰로오스, 수크랄로스, 오렌지미크론ZD-0567IF, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 페퍼민트미크론ZD-7741, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 백색의 세립과 연갈색의 세립이 혼합된 세립제입니다.

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체할, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진

[용법·용량] 1일 3회 식후에 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.
만 15세 이상, 성인 : 1회 1포, 만 11세 이상-만 15세 미만 : 2/3포, 만 8세 이상-만 11세 미만 : 1/2포,
만 5세 이상-만 8세 미만 : 1/3포, 만 3세 이상-만 5세 미만 : 1/4포, 만 1세 이상-만 3세 미만 : 1/5포

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 수술부(모유로 이행해서 젖먹이의 맥박이 빨라질 수 있습니다.)
- 3) 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않습니다. 또 만 3개월 이상이더라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직합니다.
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 위장진통 · 진경제
- 2) 테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타나는 사람
- 2) 신장장애 환자
- 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 6) 인산염 저하가 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 상당시 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 경우
 - 3) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 4) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
- 3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

[포장단위] 1.5g/포×100

[최신정보 확인방법] 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapham.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 오 · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제신청] 1644-6223(한국약품안전관리원)

BNTP100-20C006 작성일자 2020. 03. 08

제조의뢰자

동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공정 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단로
200-231, 2A, 4A층

제조사

콜마파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리2로 93 경기도화성시양감면초록로720-37

(주)보락

(유)한풍제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 3011-3층, 5층, 봉동로 705