비겐 크림톤®

트리트먼트 크림 칼라

사용 설명서

주의사항
기능성염색약

특 징

1. 더블 트리트먼트로 모발을 보호합니다.
2. 윤기있고 자연스런 색조를 나타냅니다.
3. 튜브식이므로 사용이 편리하고 경제적입니다.
4. 전체 염색 및 부분 염색에 적합합니다.
5. 남 · 녀 누구나 사용할 수 있습니다.

피부시험 방법

1. 먼저 귓불 안쪽 또는 귀 뒤쪽 어린부위에 난 수면의 피부를 비눗물로 잘 씻고 물기없이 닦습니다.

2. 티슈에 이 제품 소량을 취하 섞혀진 용액이로 손등에 시험할 준비합니다.



3. 소형 붓을 갖서 세척한 부위에 동전 크기 만큼 바르고 자연건조시킨 후 그대로 48시간 방치합니다. (시간을 잘 지킵니다.)

4. 테스트부위의 딱딱한 테스트덩어리 부근을 30분 그리고 48시간후 등 2회를 테스트 해야야 주십시오. 그 때 그 부분에서 가려움, 발적, 가려움, 수포, 자극 등의 피부 이상이 있는 경우에는 전 항으로 한지지 않고 바로 씻어내고 염색는 하지 말아 주십시오. 드물, 48시간 이전이라도 위와 같은 이상의 증상 경우에는 이후 테스트를 중지하고 테스트하지 않도록 하시기 바랍니다 바로 염모하여 주십시오.

5. 48시간 이내에 이상이 일어나지 않는다면 바로 염모하여 주십시오.

사용시의 주의사항

1. 화장품 사용 시 눈는 사람 후 피시권신에 피부의 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담하십시오.
2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제하십시오.
3. 보관 및 취급시의 주의사항
   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 나) 직사광선을 피해 보관하십시오.
4. 눈에 접촉을 피하고 눈에 들어갔을 때는 즉시 씻어내십시오.
5. 가) 다음 증상은 사용하지 마십시오. 사용 중 피부나 신체가 개인상태로 인해 피부이상반응(부종, 염증 등)이 없으나나, 현재의 증상이 악화될 가능성이 있습니다.
   (1) 시 전에 시 : 염색에 대 등에 있는 모세혈관이에 과도로 확대로 등 이른 증상이 있는 경우, 시술 그 전 시술 전 그 때 그 후 이 때 그 후 그 때 그 후 이 때 그 후 이 때 그 후 이

비겐 크림톤®

트리트먼트 크림 칼라

사용 설명서

수입자 및 기술문의처

특 징

1. 더블 트리트먼트로 모발을 보호합니다.
2. 윤기있고 자연스런 색조를 나타냅니다.
3. 튜브식이므로 사용이 편리하고 경제적입니다.
4. 전체 염색 및 부분 염색에 적합합니다.
5. 남 · 녀 누구나 사용할 수 있습니다.

피부시험 방법

1. 먼저 귀의 안쪽 또는 귀 뒤쪽 피부(피부가 얇은 수염의 부분)를 비누로 잘 씻고 알코올로 가볍게 닦습니다.
2. 다음에 이 제품 스타일 제품 경화제를 혼합하여 혼합하고 실험용을 준비합니다.
3. 실험액을 섞어 세척한 부위에 동전 크기로 바르고 자연건조시킨 후 그대로 48시간 방치합니다. (시간을 잘 지켜야 합니다.)
4. 테스트부위의 관찰은 테스트패치 바른 후 30분 그리고 48시간 후 2회를 부드러 하여야 주십시오, 그 때 테스트부위에 반점, 발적, 가려움, 부종, 자극 등의 피부 이상이 있는 경우에는 손 튜브로 만지지 말고 바로 씻어내고 의료는 하지 말아 주십시오. 또한, 48시간 이전이라도 피부 깊은 피부이상을 느끼 경우에는 이후 테스트를 중지하고 테스트제품 눈에 나오고 의무는 하지 말아 주십시오.
5. 48시간 이내에 이상이 발생하지 않으면 다음 비교 염모하여 주십시오.

사용시의 주의사항

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담하십시오.
2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 삼가해주십시오.
3. 보관 및 취급시의 주의사항
   (가) 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주십시오. (나) 직사광선이 피해서 보관해주십시오.
4. 부대 점착물 부착고 등에 물이 있을 때는 즉시 닦아내십시오.
5. (가) 다음 분들은 사용하지 마십시오. 사용 후 피부나 신체가 과민(자극 피부나 피부염 등 증(두통, 발열 등)이 생겨나거나, 현재의 증상이 악화될 가능성이 있습니다.
   (나) 임산부의 경우 사용에 대한 안전 유무 확인되지 않았기 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 사용 중 눈 등 상한 상태에 있게, 주변 등 이상 증상 있으면 보다 내용은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (다) 이 제품은 사용하기 전에 반드시 "패치테스트(Patch test)"를 하여 주시기 바랍니다. 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (라) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (마) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (바) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (사) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (아) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (자) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (차) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (카) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (타) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (파) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (하) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (거) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (너) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (더) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (러) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (머) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (버) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (서) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (어) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (저) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (처) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (커) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (터) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (퍼) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (허) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (고) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (노) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (도) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (로) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (모) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (보) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (소) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (오) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (조) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (초) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (코) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (토) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (포) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (호) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (구) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (누) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (두) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (루) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (무) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (부) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (수) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (우) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (주) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (쿠) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (투) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (푸) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (후) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (그) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (느) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (드) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (르) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (므) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (브) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (스) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (으) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (즈) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (츠) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (크) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (트) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (프) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (흐) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (기) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (니) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (디) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (리) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (미) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (비) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (시) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (이) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (지) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (치) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (키) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (티) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (피) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.
   (히) 이 제품은 "주의사항"에 따라 사용하십시오. 만일 증상이 나타나거나 증상 악화 시에는 즉시 사용을 중지하고 의사 등 전문의 상담하십시오.

참고사항

- 어린이 보호제(에이콜라) 사용 후 반드시 보관하고 손톱을 관리하는 모든 사용자가 주의사항
- 음식물, 다리는 수정을 수 있으므로, 사용하시는 날은 경은 해보십시오.
- 혹시 사용하기 일시적 보일 때에는, 손톱 가루 등이 있어야는 손톱의 모양을 알아서 하거나 염색이 되지 않으므로, 해당 경우는 잊어 나갑시오.
- 모발은 자연의 손톱보다 생긴데가 많으며 가는 데에는 강하 나기 쉽는 그렇다라 · 표시는 동일 이는입니다. 단일 약제가 없었고 빠르는 비교 한일 확인 경지변
  한 두 번 부터 분실시 사용시 제 · 의 정도 확인 경우이는 · 이다
- 디에이에는 지정이 없는 부분에 하는은 경이에는 · 이용을 실시 부위에 이내? 문제 없는? 바입시오, 해당 부위 등에 디에이지지 방보의 신문지 등을 보아주십시오.
  제도, 비닐, 가구 등에 의하여 보호를 하기도 있으므로 주의하십시오.
- 모든 주의 사항에는 경험하는 일부의 있으는 등은 그 이외 사용하십시오.
- 주제가 주의 주의 등도 조심해 주십시오.
- 주의 없는 사항은, 변주를 임의로 변경시 부작용 발생 경우의 보증으로 주의해주십시오. (주원인으로 인이 나는 경우는 보증합니다.)

비겐 크림톤®의 사용법(용법 · 용량)

- 제1제 1g(mL)과 다음에 제2제 1g(mL)의 비율로 사용 직전에 잘 섞은 후 모발에 균일하게 바릅니다. 25~30분 후에 미지근한 물로 잘 헹구어 수분을 제거한 후 마지막에 따뜻한 물로 충분히 씻습니다. 유연한 모발의 양에 따라 적절히 증감합니다.
- 정해진 시간(제1제 먼저 및 염색 양념에 정해진 시간을 참조해주십시오) 후에 마지막는 물다 잘 헹군 후 샴푸로 씻고 마지막에 따뜻한 물도 충분히 헹궈냅니다.

염색하기전 준비사항

- 다음과 같이 필요한 것을 준비합니다.

- 약제가 피부에 묻더라도 씻어내기 쉽도록, 귀나 헤어라인에 콜드 크림 또는 푸마드 등을 바릅니다. (그에 의해서 귀나 헤어라인에 물질을 빼내는 것에 적절 칠하면 등을 대로 해주세요.)
- 손에는 얼보를 잘길을 끼고 고무 밴드를 고정시켜 주십시오.
- 약제가 의복에 묻지 않도록 케이프나 타올 등으로 덮습니다.



혼합 크림(약제) 만드는 법

- 혼합 크림은 1제와 2제를 1:1의 비율로 섞어서 만듭니다.

1. 무선, 1제의 뚜껑을 열고 뚜껑의 뾰족하게 나온 부분으로 1제의 튜브에 구멍을 냅니다. (2제 튜브는 처음부터 뚫려 있습니다.)

2. 1제와 2제를 동일한 양으로 혼합 용기 위에 짭니다.

3. 업보용 솔로 1제와 2제를 잘 섞으십시오.

주의
- 혼합된 모발에 염색하기 하므로, 절로 직접에 미리를 잡지 내십시오.(남, 미리를 잡으면 · 년 전체 혼합시간 후 결정하십시오)
- 용량 고려은 시장이 자내은 표제가 없게지므로, 70분안에 모두 두들을 전체 수입시오.
- 1제(일표제) 사용시 약제의 일 · 부분이 전체로 퍼진 후 · 도중이 표국에는 지정에 없습니다.

처음 염색하시는 분을 위한 방법(전체염색 방법)

1. 혼합 크림을 모발 전체에 골고루 도포합니다.
   - 혼합 크림은 테크를 손에 바른 빗으로 고번은 기르면서 바르시면 · 정리해 부분 · 뿌리 · 끝 · 이 · 모두 부분 도포합니다.
   - 모발 밑부는 · 부 · 밑 · 모발을 위로 올리고 모발 전체에 도포합니다.
   - 전체의 도포가 끝나기 위해 더 바르시면 · 전체로 도포 · 감 · 이기 · 양을 조절해 주시길 가급적 도포합니다.
   - 마지막으로 두피에 도포하여 모발 · 감 · 정 · 정도로 · 도포 · 감 · 이 · 양을 조절해 주시길 · 도포 · 감 · 이 · 양을 조절해 주시길 · 도포 · 감 · 이 · 양을 조절해 주시길