

		디자인 담당자 신애	
제품명	챔프코프액(천안)	자재명	인서트
출고날짜	2023. 06. 29	규격	140 x 285
인쇄도수	1도 		
후가공		재질	모조지
확인 사항	항목		체크
	표기 문구, 바코드		o
비고	[참고 : 적용필요사항] - 모든 글자 크기 7pt 이상 - 줄 간격은 0.5포인트 이상		

DESIGN
DL PARTNERS
LIFE

a. 서울시 강남구 강남대로 156길 12 다복빌딩 4층 B421 t. 02 6933 4089

제품명	챔프코프액(천안) 인서트	수정 횟수	이관 횟수
의뢰일자	2023/06/28 인계일자 2023/06/29	1	4
원고업체	장관혁 (02-6933-4089)		

챔프 코프액

목감기

무색소
무부존제

일반의약품

[제품명] 챔프코프액

[유효성분] 이 약 100mL 중

티페피딘시트르산염(KP) 50mg

dl-메틸에페드린염산염(KP) 62.5mg

구아이페네신(KP) 250mg

[첨가제] 농글리세린, 백당, 수크랄로스, 시트르산, 아스코르브산, 에데트산나트륨수화물, 자몽향, 정제수, 조합향료 (포도향 TF-38688), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 프로필렌글리콜

[성상] 포도향이 있는 연한 노란색의 투명한 액제

[효능·효과] 기침, 가래

[용법·용량] 다음의 1회 용량을 1일 5-6회 복용합니다. 약 4시간 간격을 두고 복용합니다.

연령	이 약 1회 용량	연령	이 약 1회 용량
만 2세 이상 ~ 만 3세 미만	4 mL	만 8세 이상 ~ 만 11세 미만	10 mL
만 3세 이상 ~ 만 5세 미만	5 mL	만 11세 이상 ~ 만 15세 미만	13 mL
만 5세 이상 ~ 만 8세 미만	6.5 mL	만 15세 이상	20 mL

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 만 3개월 미만의 영아[갓난아기]
- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

다른 진해[기침을 그치게 함] 거담제[가래약], 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염[코염]용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염[코염], 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자[노인], 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적[홍혈되어 붉어짐], 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 복용시에는 음주하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 5mL/포 X 10

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[최신정보확인방법]

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

작성일자 : 2023. 06. 28

CPC50D-23F005

[제조·판매자] 동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1, 2A, 4A층)

