

| 동아제약 | | 디자인 담당자 | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 신애 | | | |
| 제품명 | 챔프콜드시럽 | 자재명 | 인서트 |
| 출고날짜 | 2022. 12. 06 | 규격 | 140 x 285 |
| 인쇄도수 | 1도  Black | | |
| 후가공 | | 자질 | 모조지 |
| 확인 사항 | 함목 | | 체크 |
| | 표기 문구, 바코드 | | o |
| 비고 | <p>*디자인 리뉴얼 - 4도 → 1도 변경 - 사이즈 확인 요망</p> <p>일반의약품, 제품명, 유효성분 : 7pt 이상 / 이외 글자 : 6pt 이상 / 줄 간격 : 0.5pt 이상</p> | | |



챔프 콜드 시럽

종합 감기

청포도

[제품명] 챔프콜드시럽

[유효성분] 1포(5mL) 중

| | |
|-------------------------|---------|
| 아세트아미노펜(KP) ----- | 70.00mg |
| 클로르페니-라민알레산염(KP) ----- | 0.63mg |
| DL-메틸에페드린염산염(KP) ----- | 6.25mg |
| 구아이페네신(KP) ----- | 20.83mg |
| 티페피딘시트르산염(KP) ----- | 5.00mg |
| 리보플라빈포스페이트나트륨(KP) ----- | 0.25mg |

[첨가제]
농글리세린, 백당, 수크랄로스, 시클로덱스트린, 시트르산, 아스코브산, 에데트산나트륨수화물, 자몽향, 정제수, 조합향료(청포도향 SFL-2104003/1), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 포비돈, 프락토올리고당, 프로필렌글리콜

[성상] 파우치에 든 청포도향이 있는 노란색 ~ 황갈색의 시럽제

[효능 · 효과]
감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법 · 용량]
1일 3회 식후 30분 및 필요 시 취침 시에 복용하되, 복용간격을 4시간으로 한다.

- 만 15세 이상: 1회 3포(15mL)
- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만: 1회 2포(10mL)
- 만 7세 이상 ~ 만 11세 미만: 1회 1½포(7.5mL)
- 만 3세 이상 ~ 만 7세 미만: 1회 1포(5mL)
- 만 2세 이상 ~ 만 3세 미만: 1회 3/4포(3.75mL)

[사용상의 주의사항]

1.경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 놓포증(급성 전신성 발진성 고름물집증) (AGEP), 스티븐스 - 존슨 증후군(SJS), 독성 표피괴사증후군(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.

3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨스제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해기담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 자금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기증, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

DESIGN
LIFE

a. 서울시 강남구 강남대로 196길 12 다목빌딩 4층 B421 t. 02 6933 4089

제품명 챔프 콜드 시럽 인서트
의뢰일자 2022/11/16 | 인계일자 2022/12/06
원고업체 김범진 (02-6933-4089)

수정 횟수 4 | 이관 횟수 1

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 발진 · 발적, 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부접막증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 천식
 - ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 - ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
 - 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 5) 복용하는 동안 즐음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다양한 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온 (1~30°C)보관

[포장단위] 5mL/포×10

[최신정보확인방법]
※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
※ 사용(유통)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오순된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

작성일자 : 2022.12.01

[제조 · 판매자] 동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 경기도 이천시 경충대로 2946번길 61