


		디자인 담당자	
		신애	
제품명	챔프노즈(이천)	자재명	인서트
출고날짜	2023. 01. 13	규격	140 x 365mm
인쇄도수	1도 		
후가공		재질	모조지
확인 사항	항목		체크
	표기 문구, 바코드		●
비고	*디자인 리뉴얼		

			
제품명	챔프노즈 시럽 인서트(이천)	수정 횟수	이관 횟수
의뢰일자	2023/01/11   인계일자 2023/01/13	1	1
원고업체	김범진 (02-6933-4089)		

# 챔프노즈 시럽

코 감기  복숭아향

무색소  
무보존제

[제품명] 챔프노즈시럽

[유효성분] 이 약 100mL 중

클로르페니라민말레산염 (KP) ..... 0.02g

슈도에페드린염산염 (USP) ..... 0.3g

[첨가제]

농글리세린, 백당, 복숭아향 SFL-176014, 수크랄로스, 시트르산, 자몽향, 정제수, 카르복시메칠셀룰로오스나트륨, 프로필렌글리콜

[성상] 복숭아향이 있는 연한 황색의 투명한 시럽제

[효능·효과] 다음 증상의 일시적 완화 : 눈의 가려움, 눈물, 콧물, 코 또는 인후(목구멍)의 가려움, 재채기, 코막힘 및 부비동 울혈

[용법·용량] 4~6시간마다 다음 용량을 복용하고, 24시간 동안 4회를 넘지 않습니다.

연령	체중	1회 투여량
2 ~ 6세	11 ~ 21kg	5mL (1포)
6 ~ 12세	22 ~ 43kg	10mL (2포)
12세 ~ 성인	44kg 이상	20mL (4포)

※만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEP)과 같은 중증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 모노아민옥시다아제 억제제 (MAOI-우울증, 정신 및 감정장애, 파킨슨병 치료제 중 일부)를 투여중이거나 투여를 중지한지 2주 이내인 사람
- 2) 만약 처방약에 모노아민옥시다아제 억제제 (MAOI)의 포함 여부를 모를 경우, 이 약 복용 전에 의사나 약사에게 문의하십시오.

3. 다음 환자는 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 녹내장, 또는 천식이나 만성기관지염과 같은 호흡 장애가 있는 사람
- 2) 진정제 또는 신경안정제를 복용중인 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 권장량을 초과하지 마십시오.
- 2) 이 약은 특히 어린이에게 흥분상태를 유발시킬 수 있습니다.
- 3) 이 약은 현저한 졸음을 일으킬 수 있으며 진정제 및 신경안정제의 병용(함께 복용)으로 졸음효과가 상승될 수 있습니다.
- 4) 불안, 어지러움 또는 불면증이 생기면 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.
- 5) 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEP), 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 중증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 경우 복용을 중지하고 의사나 약사와 상의하십시오.
- 6) 증상이 7일 이내에 개선되지 않거나, 열이 나는 경우 복용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.
- 7) 인후(목구멍)통이 2일 이상 지속되거나 두통, 발열, 발진, 구역 또는 구토와 같은 증상이 나타나는 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.
- 8) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발생할 경우 이 약의 복용을 중단해야 합니다.

5. 과량투여시의 처치

- 1) 부주의로 과량 복용 시, 즉시 의사·약사의 도움을 받으십시오.
- 2) 아무런 증상이 나타나지 않더라도 즉각적인 의학적 조치를 취하십시오.

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관합니다.

[포장단위] 5mL/포x10

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C 이하 보관

[최신정보확인방법]

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지([www.dapharm.com](http://www.dapharm.com))에서 확인할 수 있습니다.

·이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

·구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

작성일자 : 2023.01.09

CPN50D-23A006

제조·판매자  동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1, 2A, 4A층)

