

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 질환부위가 곪아 있는 사람
- 2) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 전립샘비대증으로 인한 배뇨곤란 환자
- 3) 수유부(모유로 이행되어 젖먹이의 맥박이 빨라질 수 있다)

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) di-메틸에페드린염산염, 스코폴리아엑스 및 글리시리진산 함유 좌제 또는 연고제, 크림제
- 2) 혈압강하제, 항우울약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약 사용에 의해 총혈되어 붉어짐, 부종(부기), 자극감, 화농(끓음) 등의 증상이 나타날 경우
- 2) 이 약 사용에 의해 알레르기 증상(발진, 총혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
- 3) 7일정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우
- 4) 출혈이 있는 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것
- 3) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.