

동아제약		디자인 담당자		
원미영				
제품명	노스카나 겔		자재명	인서트
출고날짜	2023.04.28		규격	120 x 200
인쇄도수	2도 Pantone 2030C Black			
후가공	-	재질	모조지	
확인 사항	항목 표기 문구, 바코드		체크 <input checked="" type="radio"/>	
비고	제조번호, 사용(유효)기간, 일반의약품 : 8pt 제목, 내용 : 8pt			

DESIGN LIFE			a. 서울시 강남구 강남대로 156길 12 다복빌딩 4층 B412   02 6933 4089
제품명	수정 횟수	이관 횟수	
노스카나 겔 인서트	3	2	

# 노스카나<sup>®</sup> noScarna<sup>®</sup> GEL

일반의약품

[제품명] 노스카나겔

[유효성분]

이 약 1g 중 해파린나트륨(KP)	500IU
알란토인(USP)	50mg
덱스판테놀(USP)	100mg

[첨가제(보존제)]

파리옥시벤조산프로필(KP) 1mg

[동물유래성분]

해파린나트륨(기원동물:돼지, 사용부위:장점막)

[기타첨가제]

글리세린, 니코틴산아미드, 디메티콘, 락트산, 신하이아연, 스위트허브향(HF-92304), 에탄올, 정제수, 카보머호모폴리머,  
토코페롤아세테이트, 트롤아민, 폴리에틸렌글리콜200

[성상]

흰색의 불투명한 젤제

[효능·효과]

상처 조직의 치료, 후처치(비대성·켈로이드성 흉터, 여드름 흉터, 수술 흉터)

\* 아물지 않은 상처에는 이 약을 사용하지 마십시오.

[용법·용량]

성인 및 2세 이상의 소아: 상처 및 주변 피부에 1일 수회(여러 차례) 적용하여 가볍게 마사지합니다. 성인의 경우에는,  
비후성 흉터에 대해서는 전날 두껍게 바르고 끝대로 고정하여, 하루 저녁 동안 적용할 수도 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람(부위)은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약의 구성성분에過민한 환자
- 2) 6개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 해파린에 과민반응 [해파린유도 저혈소판증(Heparin-induced thrombocytopenia, HIT) 등]을 일으켰거나,  
출혈경향 및 저혈소판증이 있는 경우

4) 절개되거나 아물지 않은 상처

5) 점막 및/또는 화농(곪음) 성 감염 부위

6) 임산부

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 마십시오.

이 약의 사용과 직접적으로 관련된 문헌은 없으나, 전신 작용의 해파린에 대해서는 항응고제(쿠마린, 아스피린, 디피리다몰,  
덱스트란, 스트렙토카니제)와 동시 사용 시 출혈의 위험이 증가할 수 있으므로, 항응고제와 동시에 사용하지 않습니다.

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 눈주위와 점막에는 적용하지 않습니다.
- 2) 흉터가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의합니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

수유부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.  
알레르기 반응

6. 기타이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 2~12세 미만 소아의 광범위 부위 적용과 2세 미만 영아(갓난아기)의 적용은 의사의 지시를 따릅니다.
- 2) 붕대의 밀봉 효과로 인해 주성분의 침투가 증가되고 피부 밖으로 배출될 수 없기 때문에 어린이, 특히 영아(갓난아기)에게는  
붕대로 고정하여, 하루 저녁 동안 적용하는 방법은 적절하지 않습니다.
- 3) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 끼어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질  
저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

[포장단위]

10g/튜브, 20g/튜브

[최신정보확인방법]

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지([www.dapharm.com](http://www.dapharm.com))에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002 (고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제신청 전용번호)

작성일자: 2023.04.24

NOSDR-23D002

[제조·판매자]



본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 경기도 이천시 경충대로 2946번길 61



⑧ 등록상표