



일반의약품



[제품명] 터비뉴더블액션젤

[유효성분] 이약 1g 중

디펜히드라민염산염(USP) 10mg

리도카인(USP) 20mg

에녹솔론(BP) 1mg

이소프로필메틸페놀(별규) 10mg

테르비나핀염산염(EP) 10mg

[기타첨가제] 락트산, 소수화히드록시프로필메틸셀룰로오스, 에탄올, 정제수, 콜로이드성이산화규소

[성상] 무색 - 미황색의 반투명한 겔제

[효능 · 효과] 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

[용법 · 용량] 1일 1회 적량을 환부(질환 부위)에 도포한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 눈과 눈 주위, 점막(예를 들어 입안, 코안, 질 등), 음부, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습기침, 짓무름, 갈라짐 또는 상처가 심한 질환부위
- 4) 손톱, 두피

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질의 사람
- 4) 질환부위가 얼굴에 있거나 광범위한 사람
- 5) 질환부위가 깊은 사람
- 6) 「습진」과 「무좀 · 완선(사타구니백선), 체부백선」의 구분이 불확실한 사람
(음부가려움, 짓무름 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부 : 염증, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 상처, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐, 통증, 색소 침착, 자극감, 열감, 인바늘, 짓무름, 수포, 발진 발적(충혈되어 붉어짐)*, 가려움증*, 붓기*, 두드러기* (* : 전신에 발현할 수도 있습니다.)
- 2) 2주정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 또는 이 약의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 용량을 준수할 것
- 2) 질환 부위와 그 주위를 깨끗이 한 후 사용할 것
- 3) 눈에 들어가지 않도록 주의. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 온수로 씻어내고, 즉시 안과와의 진료를 받을 것
- 4) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
- 5) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것
- 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것.
그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후는 품질유지를 위해 최대한 빨리 사용할 것
- 5) 합성수지(스티롤 등)를 연화시키거나, 도료를 녹이거나 하는 경우가 있기 때문에, 바닥이나 가구 등에 묻지 않도록 할 것
- 6) 화기에 가깝게 두거나 불속에 넣거나 하지 말 것. 또한 사용이 끝난 용기는 불속에 던지지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30그램/튜브

[최신정보확인방법]

- 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국약품안전관리원)

작성 연월일 : 2020.02.03

TBGD30-20B001

[제조의뢰자]

동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1, 2A, 4A층)

[제조사]

(주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47