

○ 좁쌀여드름에



일반의약품

좁쌀 여드름 부위

1일 2회 아침, 저녁으로 도포

[제 품 명] 애크린겔(살리실산)

[유효성분] 이 약 1g 중
살리실산(BP) ----- 20 mg

[첨가제(보존제)] 메틸파라벤 1mg

[기타 첨가제] 에탄올(95), 정제수, 카보머인터폴리머, 트롤아민, 티트리오일, 폴리에틸렌글리콜200, 폴리옥실40·경화피마자유, 프로필렌글리콜

[성상] 무색~미황색(연노랑)의 반투명한 겔제

[효능·효과] 여드름 치료

[용법·용량] 1일 2회 아침, 저녁으로 바른다.
과도한 피부 건조가 발생할 수 있으므로 1일 1회로 시작한다.
피부 건조 또는 벗겨짐이 발생할 경우 이틀에 한 번으로 적용 횟수를 줄일 수 있다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자(부위)에는 사용하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 당뇨병 환자
 - 혈액순환장애 환자
 - 눈주위 및 점막
 - 감염, 염증, 발적(충혈되어 붉어짐) 또는 자극이 있는 부위
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 약물 또는 화장품 등에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염)의 병력이 있는 환자
 - 간장애, 신장애 환자(살리실염이 피부에 대량 흡수될 경우 중독을 유발하므로 간장애 및 신장애 환자에는 광범위한 피부에 장기간 적용하지 않는다.)
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 대량 장기간 연용(계속 사용)시 피부염, 피부궤양이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 이 약이 정상 피부에 닿았을 경우에는 국소 자극 반응이 나타날 수 있으며 이러한 반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 수화(여러 차례) 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 수두 또는 인플루엔자가 있는 소아 및 청소년에게 살리실산 제품 투여시 라이 증후군의 가능성을 고려해야 한다.

- 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 이 약은 외용으로만 적용하고, 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 화농(끓음)성 피부염, 습윤(습기 참), 미란(긁무름)의 경우에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 적용한다.
 - 광범위 병소(아픈부위)에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용한다.
 - 환부(질환 부위) 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.
 - 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸 후 의사의 지시에 따른다.
 - 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 이 약을 경구투여한 동물실험에서 기형발생이 보고된 바 있으므로 이 약을 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 이 약이 모유로 이행된다는 보고가 있으나 영아(젖먹이)에 미치는 영향은 알려져 있지 않다.
 - 수유부에 투여시 유방 부위에 적용하지 않는다.
 - 소아에 대한 투여
 - 소아에 투여시 보호자의 지도·감독 하에 사용한다.
 - 소아는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량을 광범위한 부위에 적용하거나 장기간 사용하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사일광을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- 화기 근처에 두지 않는다.
- 사용하지 않을 경우에는 뚜껑을 잘 닫아둔다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 20그램/튜브

[최신정보 확인방법]

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제신청 전용번호)

ACL20-24B002

[제조판매자]

동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장: 경기도 이천시 경충대로2946번길 61

작성일자 : 2024.02.13

소비자
중심

공정거래위원회