

동아제약		디자인 담당자	
		안예은	
제품명	애크린외용액	자재명	인서트
출고날짜	2025. 04. 22	규격	150 x 190
인쇄도수	1도 Black		
후가공		재질	모조지
확인 사항	항목		체크
	표기 문구, 바코드		o
비고	제품명, 제조번호, 사용(유효)기간, 유효성분의 명칭 및 규격 분량, 일반의약품 표시 7pt 이상 이외의 정보 6pt 이상 출간격 0.5pt 이상*		

DESIGN OF PARTNERS LIFE a, 서울시 서초구 주촌3길 21 강남위즈타워 2층 201호 L 02-6933-4089			
제품명	애크린 외용액 라벨	수정 횟수	이관 횟수
의뢰일자	2025/04/09 인계일자	2025/04/22	
원고업체	장관혁 (02-6933-4089)		

일반의약품

aclean
애크린[®]외용액
(살리실산)

[제품명] 애크린외용액(살리실산)

[유효성분] 이 약 100g 중

살리실산(EP) 2g

[기타첨가제] 니코틴산아미드, 메크스판테놀, 수산화나트륨, 시트르산수화물, 알란토인, 에탄올(95), 정제수, 티트리오일, 폴리옥실40-경화피마자유, 프로필렌글리콜

[성상] 티트리향을 가진 무색 ~ 미황색의 투명한 액제

[효능·효과] 여드름 치료

[용법·용량] 1일 2회 아침, 저녁으로 바릅니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자(부위)에는 사용하지 마십시오.

- 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 당뇨병 환자
- 혈액순환장애 환자
- 눈주위 및 점막
- 감염, 염증, 발적(충혈되어 붉어짐) 또는 자극이 있는 부위

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사,약사와 상의하십시오.

- 약물 또는 화장품등에 의해 알레르기 증상(예 : 발진, 발적, 가려움, 옷 등에 의한 피부염)의 병력이 있는 환자
- 신부전 환자(살리실염이 피부에 대량 흡수될 경우 중독을 유발하므로 신부전 환자에는 광범위한 피부에 장기간 적용하지 않습니다.)
- 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사,약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반, 가려움이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
- 대량 장기간 연용(계속 복용(사용))시 피부염, 피부궤양이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
- 이 약이 정상 피부에 닿았을 경우에는 국소 자극 반응이 나타날 수 있으며 이러한 반응이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
- 수화(여러 차례) 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 이 약은 외용으로만 적용하고, 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 화농(끓음)성피부염, 습윤, 미란(긁무름)의 경우에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 적용합니다.
- 광범위 병소(아픈 부위)에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용합니다.
- 환부(질한 부위) 이외의 피부에 닿지 않도록 주의합니다.
- 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용합니다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸 후 의사의 지시에 따릅니다.
- 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
가) 이 약을 경구(먹는)투여한 동물실험에서 기형발생작용이 보고된 바 있으므로 이 약을 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
나) 이 약이 모유로 배출된다는 보고가 있으나 영아에 미치는 영향은 알려져 있지 않습니다.
다) 수유부에 투여시 유방 부위에 적용하지 않습니다.
- 소아에 대한 투여
가) 소아에 투여시 보호자의 지도·감독 하에 사용합니다.
나) 소아는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량을 광범위한 부위에 적용하거나 장기간 사용하지 않습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 직사일광을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 보관합니다.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.
- 화기 근처에 두지 않습니다.
- 사용하지 않을 경우에는 뚜껑을 잘 닫아둡니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100밀리리터/병

[최신정보확인방법]

- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후에 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

ACLS100-25D001

작성일자 : 2025.04.14

[제조/외자]

동아제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1, 2A, 4A층)

[제조자]

(주)퍼센

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47

