

일반의약품

aclean
vita
애크린비타겔
(니코틴산아미드)

[제품명] 애크린비타겔(니코틴산아미드)

[유효성분] 이 약 1g 중

니코틴산아미드(EP) 40mg

[기타첨가제] 1,2-펜탄디올, 덱스판테놀, 디프로필렌글리콜, 알란토인, 알로에베라 겔, 에데트산나트륨수화물, 에탄올(95), 정제수, 천연병풀향(JW9-25466), 카보머인터폴리머, 토코페롤아세테이트, 트로메타민, 폴리옥실40·경화피마자유

[성상] 무색의 투명~불투명한 겔제

[효능·효과] 경증(경증상, 가벼운 증상) 내지 중등증의 염증성 여드름의 국소치료

[용법·용량] 환부(질환 부위)를 깨끗이 씻어 내고 이 약을 1일 2회 아침, 저녁으로 환부(질환 부위)에 충분한 양을 바릅니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람(부위)은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 중증(심한 증상) 여드름 환자
- 3) 눈 주위 및 점막

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 12주 이내에 증상이 개선되지 않거나 상태가 악화된 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하십시오.
- 2) 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
- 3) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오.
- 4) 따뜻한 물과 비누로 피부를 완전히 씻은 후 환부(질환 부위)에 바르십시오. 감염된 부위를 덮기 위해 충분한 양을 사용하십시오.
- 5) 가장 빈번한 이상반응은 피부건조입니다. 기타 드물게 나타나는 이상반응으로는 피부의 가려움증, 홍반(붉은 반점), 작열감(화끈감) 및 자국이 있을 수 있습니다.
- 6) 과도한 건조감, 자극감 또는 피부 벗겨짐이 발생하는 경우 사용량을 1일 1회 또는 2일 1회로 줄이십시오.
- 7) 상태의 중증도에 따라 치료 기간은 몇 주가 걸릴 수 있습니다.

8) 여러 약물 간 발생할 수 있는 상호작용을 방지하기 위해 처방중인 다른 치료에 대해 의사나 약사에게 반드시 알려십시오.

9) 이 약은 모유로 배출되기 때문에 수유부에 사용 시 특히 주의하고 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

10) 임신 첫 3개월 동안에는 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

4) 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

5) 개봉 후에는 되도록 빨리 사용하십시오.

6) 용기가 손상된 경우, 사용하지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~25°C)보관

[포장단위] 30그램/튜브

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청]

1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

[최신정보 확인방법]

이 제품 정보의 작성일자(2026.03.24) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

작성일자 : 2026.03.24

[제조의뢰자] 동아제약(주)

ACV30-26C001

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 경기도 이천시 경충대로2946번길 61

[제조사] 태극제약(주)

충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

