

언제 어디서나, 소화엔 베나치오 이지액

- 위 운동 촉진 효과
- 휴대 간편한 파우치 타입

과식·소화불량
체함·구토
복부팽만·뭉은변

위·장
DOUBLE
CARE

1일 3회 | 만 1세 이상 | 20mL*6포

베나치오 이지액

간편하게
EASY

속을
편안하게
EASY



휴대 간편한
파우치 타입



여행 갈 때
(기내반입 가능)



위·장
더를케어

일반의약품

[제품명] 베나치오이지액
[유효성분] 1포(20mL) 중
진피(KP)..... 230mg 감초(KP)..... 167mg
육계(KP)..... 150mg 건강(KP)..... 100mg
항산(KP)..... 150mg 산출(KP)..... 40mg
오매(KP)..... 949.98mg 아선약(KP)..... 144.2mg
[첨가제(보존제)] 벤조산나트륨 12mg
[기타첨가제] L-멘톨, 고과당, 농굴리세린, 수크랄로스, 시클로덱스트린
시럽, 시트러스, 에데트산나트륨수화물, 에탄올(95), 자일리톨, 잔탄검,
정제수, 허브엑센드메이 07108
[성상] 파우치 포장에 든 특이한 방향을 가진 감초 ~ 잔한 감초의 액체
[효능·효과] 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체함, 구역,
구토, 장정, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효
[용법·용량] 1일 3회 복용하되, 복용간격을 4시간 이상으로 한다.

연령	1회 복용량
만 1세 이상 ~ 만 3세 미만	4mL(1/5포)
만 3세 이상 ~ 만 5세 미만	5mL(1/4포)
만 5세 이상 ~ 만 8세 미만	6.7mL(1/3포)
만 8세 이상 ~ 만 11세 미만	10.0mL(1/2포)
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만	13.3mL(2/3포)
만 15세 이상 및 성인	20.0mL(1포)

[사용상의 주의사항] 1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않는다. 또 만 3개월 이상이라도 만
1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경
우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직하다. 2) 다음과 같은 사람은
이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. (1) 다른 약
물을 복용하고 있는 사람 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 만 3개월
미만의 젖먹이에게 투여할 경우에는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 한
다. 3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사,
약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 무력감, 사지경
련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 (저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이
나타날 수 있다.) (2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4)
기타 이 약의 복용시 주의할 사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2)
어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것. 5) 저장
상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선
을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘
못사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[유효기간] 080-920-2002 (고객만족팀)
[최신정보 확인방법] 이 제품 정보의 작성일자(2024.05.03) 이후 변경
된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 1644-6223(한국의약품안전관리원),
14-3330(피해구제 신청 전용번호)



제조번호 :
사용기한 : 까지



1일 3회 | 만 1세 이상 | 20mL*6포