

[유효성분] 1병(75mL) 중 감초(KP) 330.00 mg, 건강(KP) 126.50 mg, 산사(KP) 288.00 mg, 우르소데옥시콜산(EP) 20.00 mg, 육계(KP) 189.75 mg, 진피(KP) 290.95 mg, 창출(KP) 50.60 mg, 현호색(KP) 240.00 mg, 회향(KP) 189.75 mg [보존제] 벤조산나트륨 45.00 mg [기타첨가제] 고과당, 수크랄로스, 시클로덱스트린, 시클로덱스트린시럽, 시트르산, 에데트산나트륨수화물, 에탄올(95), L-멘톨, 엘에스303, 자일리톨, 정제수, 폴록사머 407, 허벌엣센스디에이 07108 [성상] 갈색 유리병에 든 특이한 방향을 가진 미황색(연노랑)~황갈색의 액제

[효능·효과] 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체합, 구역, 구토, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부 팽만감

[용법·용량] 1일 3회 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. **만 15세 이상, 성인: 1회 1병, 만 11세 이상 - 만 15세 미만: 2/3병, 만 8세 이상 - 만 11세 미만: 1/2병, 만 5세 이상 - 만 8세 미만: 1/3병, 만 3세 이상 - 만 5세 미만: 1/4병, 만 1세 이상 - 만 3세 미만: 1/5병**

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않는다. 또한 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용 시키지 않는 것이 바람직하다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. (1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 라벨을 소지할 것. (1) 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인 되는 경우(저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이 나타날 수 있다.) (2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것 5. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것 (3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [문의사항] 080-920-2002(고객만족팀)

[최신정보 확인방법]

이 제품 정보의 작성일자(2025.10.22) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제신청 전용번호)
※ 라벨에는 의약품 정보가 포함되어 있으므로 복약 종료시까지 버리지 마시고 보관하여 주시기 바랍니다. ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.
※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오. ※ 생약 함유 제제이므로 때때로 침전이 생기는 경우가 있지만, 약효는 변함이 없습니다.

[제조의뢰자·제조사(일부공정)]

동아제약(주)

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로
200-23 (1, 2A, 4A층)

[제조사(일부공정)]

(유)한풍제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301,
봉동로 705



18806265022011

BNTPRO75A-25K002