

각질이 쌓여 두꺼워진 피부에 바르세요!

keranon Ointment

케라논연고

일반의약품

【제품명】케라논연고

【유효성분】이 약 1g 중

살리실산(EP)	50mg
우레아(KP)	100mg

【첨가제(보존제)】

벤조산나트륨	2mg
--------------	-----

【기타 첨가제】글리세린모노스테아레이트, 농글리세린, 덱스판테놀, 디프로필렌글리콜, 백색바셀린, 쉐어버터, 스테아르산, 이산화규소, 조합향료(내추럴플라워 HP-BD21841), 폴리에틸렌글리콜400, 폴리옥실40스테아레이트

【성상】흰색 내지 미황색의 연고

【효능·효과】비늘 및 과다 각화 피부질환(예: 비늘증, 각질화된 습진 및 건선), 손발의 과다 각화증

【용법·용량】성인: 1일 1~2회 환부를 씻은 다음 이 약을 바른 후 충분히 문지른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람(부위)은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에過민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 수두, 독감 환자
- 3) 2세 미만의 신생아·영아
- 4) 눈 주위 및 점막
- 5) 신장애 및 간장애 환자에 장기간 사용하거나 광범위하게 적용하는 경우
- 6) 당뇨병 환자
- 7) 혈액순환장애 환자
- 8) 감염, 염증, 발적 또는 자극이 있는 부위
- 9) 급성 습진 또는 염증성 피부질환 환자
- 10) 점, 태어날 때부터 있는 점 또는 사마귀, 털이 있는 사마귀 및 생식기 부위의 사마귀

2. 이 약을 사용하는 동안 다음과의 약을 사용하지 말 것

1) 살리실산 성분을 함유한 의약품

3. 이 약을 사용하는 동안 다음과의 행위를 하지 말 것

- 1) 모유 수유 중에는 가슴 부위에 사용하지 말 것
- 2) 눈이나 점막에 바르지 말 것

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장 및 간 기능 장애가 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부를 대상으로 한 임상시험은 없음) 및 수유부
 - 3) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있음)
 - 4) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있음)
 - 5) 약물 또는 화장품등에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발적, 가려움, 옻 등에 의한 피부염)의 병력이 있는 환자
 - 6) 2세 이상 어린이, 청소년(이 약에 대한 안전성·유효성이 확립되지 않음)
5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
- 1) 귀 울림, 이명, 청력 상실, 코피, 메스꺼움 및 구토, 과민성 또는 점막의 건조와 같은 증상
 - 2) 새로 생긴 습진에 사용시 발적, 작열감 또는 가려움증과 같은 국소 피부 반응과 알레르기성 접촉 피부염 증상

3) 수회 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우

6. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 이 약은 외용으로만 사용할 것
- 2) 정해진 용법·용량을 준수할 것
- 3) 살리실산이 피부에 흡수 될 경우 중독을 유발할 수 있으므로 신장 및 간 기능 장애가 있는 환자는 짧은 시간 동안 피부의 국소 부위(직경 약 10cm)에서만 사용할 것
- 4) 임신 중에 사용할 때는 주의해서 사용하고 짧은 시간동안 피부의 국소부위에서만 사용할 것
- 5) 이 약에 의해 코르티코이드, 디트라닐, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있음
- 6) 메토트렉세이트 또는 쿠마린 유도체와 병용 시 살리실산에 의해 노출이 증가하여 독성이 증가할 수 있음
- 7) 설포닐우레아와 병용 시 살리실산에 의해 노출이 증가하여 혈당저하작용이 증가할 수 있음
- 8) 궤양, 미란(짓무름), 상처 부위에는 직접 적용하지 말 것
- 9) 화농성피부염, 습윤, 미란(짓무름)의 경우에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 적용할 것
- 10) 광범위 병소에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용할 것
- 11) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
- 12) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 사용할 것. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸 후 의사의 지시를 따를 것
- 13) 소아에 적용 시 보호자의 지도, 감독하에 사용할 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 끼어내 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 4) 용기가 손상된 경우, 사용하지 말 것
- 5) 사용 기간이 지난 제품은 사용하지 말 것
- 6) 개봉 후에는 되도록 빨리 사용할 것

【저장방법】차광기밀용기, 실온보관(1~25°C)

【포장단위】60그램/튜브

【문의전화】080-920-2002(고객만족팀)

【부작용 보고 및 피해구제 신청】1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

【최신정보 확인방법】

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

작성일자 : 2025.07.25



KRN-25F001

【제조의뢰자】

동아제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 경기도 이천시 경충대로2946번길 61

【제조자】

(주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47