



일반의약품

【제품명】노드라나액

【유효성분】이약 1g 중

글리시리진산이칼륨(KP)..... 5mg

알란토인(USP)2mg

헤파리노이드(별규)3mg

【첨가제(보존제)】

벤조산2mg

【동물유래성분】헤파리노이드(기원동물: 돼지, 사용부위: 기관연골을 포함한 폐장)

【기타첨가제】1,2-펜탄디올, 데카메틸시클로펜타실록산, 텍스판테놀, 디메티콘, 모노앤디글리세리드, 부틸렌글리콜, 쉐어버터, 스쿠알란, 에데트산나트륨수화물, 자기유화형글리세린모노스테아레이트, 잔탄검, 정제수, 조합향료(라툴립향 HP-BA59039), 중쇄트리글리세리드, 천연병풀향(JW9-25466), 카보머코폴리머, 트로메타민, 폴리스orb에이트80, 폴리옥시40경화피마자유, 히드록시에틸셀룰로오스, 히알루론산나트륨

【성상】유백색의 불투명한 외용액제

【효능·효과】

성인·노인의 건피증(피부건조증), 소아의 건조성 피부, 추위로 인한 손발의 살갓의 틈, 거친 피부, 팔꿈치·무릎·발뒤꿈치·발목의 각화증, 가벼운 동상(염증제외), 타박상·염좌 후의 부종·근육통·관절통

【용법·용량】

1일 1~수회 적당량을 환부에 문질러 바르거나 거즈 등에 펴바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 출혈성 혈액 질환(혈우병, 혈소판 감소증, 자반증 등)이 있는 사람(혈액응고 억제작용을 가지므로, 출혈을 일으킬 우려가 있다.)
- 3) 경미한 출혈도 심각한 결과를 초래할 것으로 예상되는 사람(혈액응고 억제작용이 있고 출혈을 조장할 우려가 있다.)
- 4) 눈 주위, 입술 등의 점막부위, 상처 또는 빨갛게 부어오른 곳, 짓무름, 심하게 갈라진 곳
- 5) 아토피성 피부염 증상이 있는 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람(약이나 화장품에 의한 알레르기 증상(예를 들어 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부어오름 등)을 일으킨 적이 있는 사람)

3) 습윤, 짓무름 등이 심한 사람

4) 아토피성 피부염을 진단받은 적이 있는 사람

3. 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 사용을 중지하고 의사, 약사와 상담할 것. 상담 시 가능하면 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 피부 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 자극감(통증, 발열, 따가움), 부스럼, 부종과 같은 증상이 나타났을 경우
- 2) 5~6일간 사용해도 증상이 나아지지 않는 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 이 약은 벤조산을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 3) 사용 후엔 뚜껑을 꼭 닫을 것
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 행구고, 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진료를 받을 것
- 5) 외용으로만 사용할 것
- 6) 본 제품이 닿은 손으로 눈이나 점막 등에 접촉하지 않도록 할 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 고온 및 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 4) 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 않도록 하며, 사용기한 내라도 개봉 후에는 가급적 빨리 사용할 것

※ 상처가 있는 부위에는 사용하지 말 것

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】50그램/병

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.dapharm.com) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

【문의전화】080-920-2002(고객만족팀)

【부작용보고 및 피해구제신청】

1644-6223(한국의약품안전관리원),
14-3330(피해구제 신청 전용번호)

작성일자: 2025.08.04

NDR-25H001

【제조의뢰자】동아제약(주)

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로
200-23(1, 2A, 4A층)

【제조사】(주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47

