

 동아제약		디자인 담당자	
		안 예 은	
제품명	노스카딘 젤	자재명	인서트
출고날짜	2025.07.03	규격	120 x 180
인쇄도수	2도  Pantone 2287C  Black		
후가공	-	재질	모조지
확인 사항	항목		체크
	표기 문구, 바코드		○
비고	전사항 7pt 이상 줄간격 0.5pt 이상		

DESIGN OL PARTNERS LIFE a. 서울시 강남구 강남대로156길 12 다복빌딩 4층 B412 t. 02-6933-4089			
제품명	노스카딘 젤 인서트	수정 횟수	이관 횟수
의뢰일자	2025/05/22 인계일자 2025/07/03	6	1
원고업체	장관혁 (02-6933-4089)		

일반의약품

노스카딘[®] 젤 (푸시드산수화물)
noscardin[®] GEL

[제품명] 노스카딘젤 (푸시드산수화물)

[유효성분]

1g중
푸시드산수화물 (EP) 20mg(역가)

[첨가제(보존제)]

메틸파라벤 1.6mg, 프로필파라벤 0.4mg

[기타첨가제]

덱스판테놀, 디메티콘, 디프로필렌글리콜, 스위트허브향(HF-92304), 알로에베라겔, 정제수, 천연병풀향(JW9-25466), 카보머, 트롤아민, 폴라소르베이트80, 히알루론산나트륨

[성상]

흰색의 불투명한 겔제

[효능·효과]

- 유효균종
포도구균(포도알균), 연쇄구균, 코리네박테륨, 클로스트리듐
- 적응증
- 농피증(고름피부증) [농가진(고름딱지증), 감염성습진양피부염, **심상성여드름(보통여드름)**, 모낭염, 종기 및 종기증, 화농성한선염, 농가진성습진], 화상·외상(상처)·봉합창(폐렴상처)·식피창(피부 이식후 생긴 상처)에 의한 2차 감염

[용법·용량]

1일 3~4회 적당량을 환부(질환 부위)에 부드럽게 바른다. 다만 드레싱을 할 경우에는 1일 1~2회 정도로 횟수를 줄이는 것이 바람직하다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 푸시딘산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 비감수성균(특히 녹농균)에 의한 감염 환자
- 3) 항생물질 성분 또는 첨가제에 알레르기 환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 동물실험에서 결막과민반응은 나타난 적 없으나 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 안쪽에 사용하는 것은 바람직하지 않다.
- 3) 감작될 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작된 증후(가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 이 약은 높은 투과 흡수성을 가지므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의한다.
- 5) 국소사용 시 내성균이 발현되면 추후 동일한 항생물질을 경구투여 시 해로울 수 있다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 된다.
- 6) 안과용으로 사용하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 사용하는 경우 이 약은 전신투여 시 태반관문을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료 상의 유약성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있다.
- 3) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용 시 상용량에서는 유아에 영향을 미치지 않는다.
- 4) 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애를 일으킬 수 있으므로 주의한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

일시적인 작열감(화끈감) 때때로 발진, 약한 동통 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 또한 중증(심한 증상)의 다리궤양 환자에 적용시 통증이 유발될 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위]

18g/튜브

[최신정보확인방법]

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

작성일자 : 2025.06.27.

NOSD18-25F001

[제조외래지]

동아제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 경기도 이천시 경충대로2946번길 61

[제조자]

태극제약(주)

충청남도 부여군 초촌면 금백로 821



® 등록상표