

감기 조심하세요~

판피린[®]티정

[유효성분] 이 약 1정(586mg)중

아세트아미노펜(KP)	300mg
클로르페니라민말라산염(KP)	2mg
카페인무수물(KP)	30mg

[첨가제] 스테아르산마그네슘, 아라비아고무가루, 옥수수전분, 유당수화물, 툴코, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 장방형 정제

[효능·효과]

감기의 증상(여러증상)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춣고 떨리는 증상), 발열, 관절통, 두통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

[사용상 주의사항]

(1) 경고

- 매일 세잔 0 상 정기적으로 술을 마시는 사람이 0 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 0 러한 사람0 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 과사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부 반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이 나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여 주십시오.
- 0 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 0 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

(2) 다음과 같은 사람이 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성 성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성 성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 현식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만3개월 미만의 영아(갓난아기)
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 0 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다

(3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해거담제, 다른 감기 약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멀미 약, 알레르기용약)

(4) 다음과 같은 사람이 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반 하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이증후군의 초기 증상일수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 만 3 개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 0 상인 경우도 만 2세 미만의 영 유아는 의사의 진료를 받아야 하며 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 . 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 남근관 등) 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

- 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

(5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 남)근관, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - 속(아니필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색0 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - 피부점막안중후군(스티븐스-존슨중후군), 중독성표피과사용해(리엘중후군) . 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다
 - 천식
 - 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
 - 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨0 차고 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

(6) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오
- 바르브 탈게 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

(7) 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[최신정보 확인방법]

이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 3정

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국약품안전관리원)

® 등록상표

개정년월일 : 2019. 03. 27

제조의뢰자

동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로
200-23(1, 2A, 4A층)

제조사

동아에스티

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로
200-23(2B, 3, 4B층)

PANT3-9J011